

ביוולוגיה

נושאי בחירה ונושא מחקר

חלק מבחינות 5 ייחידות לימוד

הוראות לנבחן

א. משך הבדיקה: שעה וחצי.

ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה: בשאלון זה שני פרקים, בפרק הראשון שלושה נושאים ובקצרה בפרק השני ארבעה נושאים.

עמוד	נושא	פרק שני		פרק ראשון	
		עומד	עומד	הנושא	הנושא
11	רבייה	IV	—	I	— מערכות הובלה, נשימה,
13	מיקרווארוגניוזמים	V	—		הפרשה והגנה
16	אבולוציה וטיפוח	VI	—	II	— הזנה בצמחים ובבעלי חיים
18	ביוטכנולוגיה	VII	—	III	— תורשה

עליך לענות על נושא אחד מכל פרק.
לנושא בפרק הראשון – 60 נקודות, לנושא בפרק השני – 40 נקודות; סה"כ – 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש: אין.

- ד. הוראות מיוחדות:
- (1) ענה על שאלות בק בנושאים שלמדת.
 - (2) ענה על פי הנקודות המפורשות בראש כל נושא.
 - (3) בתום הבדיקה מסור לבודחן את מחברת הבדיקה.
 - (4) רשום על כריכת המחברת את שני הנושאים שענית עליהם.

כתב במחברת הבדיקה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב טיוויטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה).
רשום "טיוויטה" בראש כל עמוד טיוויטה. רישום טיוויות כלשהן על דפים שמוחוץ למחברת הבדיקה עלול לפסילת הבדיקה!

הנקודות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

ב הצלחה!

/המשך מעבר לדף/

בשאלון זה שני פרקים, בפרק הראשון שלושה נושאים ובפרק השני ארבעה נושאים. בכל פרק عليك לבחור בנושא אחד שלמדת ולענות על השאלות באותו הנושא, על פי ההנחיות המפורטוות בו. (בנושא שבחורת בפרק הראשון عليك לענות על ארבע שאלות סך הכל. בנושא שבחורת בפרק השני عليك לענות על שלוש שאלות סך הכל).

שים לב: חובה לענות על שני הfrakim, וחובה לענות על נושא אחד בכל frak.
רשות על כריכת המחברת את שני הנושאים שענית עליהם.

השאלה

פרק ראשון (60 נקודות)

בפרק זה שאלות בשלושה נושאים: מערכות הובלה, נשימה, הפרשה והגנה; הזנה בצמחים ובעלי חיים; תורשה. عليك לבחור בנושא אחד ולענות בו על ארבע שאלות, על פי ההנחיות המפורטוות בנושא שבחורת.


נושא I — מערכות הובלה, נשימה, הפרשה והגנה

עונה על ארבע שאלות:

על שתי שאלות 1-2 (חובה), על אחת מהשאלות 3-4 ועל אחת מהשאלות 5-6.

עונה על שתי השאלות 1-2 (חובה).

1. האירור שלפניך מתאר את לחץ הדם בכמה סוגים של כלי דם.



(שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.)

/המשך בעמוד 3/

- א.** (1) הסבר מה גורם להבדל בין לחץ הדם הסיסטולי ובין לחץ הדם הדיאסטולי באבי העורקים.
 (2) הסבר מה גורם להבדל בין לחץ הדם בעורקים ובין לחץ הדם בעורדים.
 (6 נקודות)
- ב.** באיזה סוג של כלי דם מהירות הזירימה היא האטית ביותר? הסבר מהי החשיבות של הזירימה האטית בכללי הדם מסוג זה. (6 נקודות)

.2. יונקים הצללים במים אינם שואפים אויר במהלך הצלילה, אלא רק כאשר הם עלולים אל פניהם.

- א.** יונקים ימיים, לעומת האדם, מסוגלים לצולל לפרקי זמן ארוכים בהרבה. בטבלה ש לפניך מוצג הריכוז הממוצע של המוגולובין בدم של פיל ים (yonk ימי) ושל האדם.

הריכוז הממוצע של המוגולובין בדם (גרם/100 מ"ל דם)	היצור
24.6	פיל ים
14.2	אדם

פיל הים מסוגל לשחות מתחות לפני המים פרקי זמן ארוכים יותר מן האדם.

התבסס על הנתונים בטבלה והסביר מה אפשר זאת. (8 נקודות)

- ב.** מרכז הנשימה ביונקים ימיים רגש פחות לרמת ה- CO_2 בדם ממרכז הנשימה באדם. מהו היתרון בכך בזמן צלילה ממושכת? (7 נקודות)


עה על אחד מהשאלות 3-4.

- 3.** בחרקים מתבצע חילוף הגזים בטרכיות, ובעופות — בריאות. ציין שני תוכנות משותפות למערכת הנשימה בע בעלי חיים יבשתיים אלה, והסביר את החשיבות של כל אחת מן התוכנות שצינית לחילוף הגזים. (15 נקודות)

- א.** אדם נזכר ברגל מכווץ. תאר את המהלך של התפתחות הדלקת שנגרמה מדקירה זו.
 (7 נקודות)
- ב.** ציין שני הבדלים בין תגובת חיסון ובין התהיליך הדלקתי. (8 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 5-6.

5. לפניך גرف המתאר את מהלך הדיות במשך 24 שעות בקצב מסוים, הגדל בתנאים של חוסר מים בקרקע שבבית הגידול.




א. (1) מהו ההבדל בין הנ吐ונים בגרף זה ובין הנ吐ונים בגרף האופייני לצמחים גדלים בbatis גידול שaan בהם מחסור במים?

- (2) מהו היתרון שיש לצמח זה (שמהל הדיות שלו מותואר בגרף), המאפשר לו להתקיים בbatis גידול יבשים?

(8 נקודות) ב. הסבר את המנגנון המאפשר את השינויים בקצב הדיות ברוב הצמחים (ובכללם הצמח המתוואר בגרף). (7 נקודות)

6. תא שורש של צמח הווחקו בתמיסה מיימת המכילה מינרלים וחמצן. לפניך גرف המתאר את ההשפעה של ריכוזים שונים של חמצן בתמיסה על קצב הקליטה של מינרל מסוים על ידי תא השורש.



- א. מהי החשיבות של חמצן בקליטת המינרל על ידי תא השורש? נמק. בתשובתך התבסס על הנ吐ונים בגרף. (9 נקודות)
- ב. במה שונה הדרך של קליטת מים בשורש מן הדרך של קליטת המינרל המוצג בגרף? (6 נקודות)

נושא II – הרזיה בצמחים ובסוגי חייםענה על ארבע שאלות:על שתי השאלות 7-8 (חובה), על אחת מהשאלות 9-10 ועל אחת מהשאלות 11-12.ענה על שתי השאלות 7-8 (חובה).

7. בניסוי בדקנו את צריכת החמצן של תאים שלמים ושל חלקית תא שונים, במצע המכיל גלוקוז

או חומצה פירובית. תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה ש לפניה.

הסימן (+) מציין שהייתה צריכת חמצן, הסימן (-) מציין שלא הייתה צריכת חמצן.

הتوزעות: צריכת חמצן	החומרים במצע			החלק הנבדק
	חומר פירובית	חומר חומצה פירובית	גלוקוז	
+	אין	יש	יש	תאים שלמים
+	יש	אין	יש	תאים שלמים
-	אין	יש	יש	מיוטוכונדריה בלבד
+	יש	אין	אין	מיוטוכונדריה בלבד
-	אין	יש	יש	ציטופלטמה (לא אברוניים)
-	יש	אין	אין	ציטופלטמה (לא אברוניים)

א. הסביר את ההבדל בצריכת החמצן בין תאים שלמים ובין מיוטוכונדריה, בנסיבות

גלוקוז בלבד. (8 נקודות)

ב. הסביר את התוצאות שהתקבלו בцитופלטמה (לא אברוניים), בנסיבות גלוקוז

ובנסיבות חומצה פירובית. (7 נקודות)

8. חוקר הוכיח 4 מכלים שkopים זהים בעלי אותו הנפח. לכל אחד מן המכלים הוא הכניס חלקים אחרים של צמח מסוים. לאחר סגירת המכלים הוא האיר כל אחד מהם באור בצעיר אחר. בתחלת הניסוי כמות ה- CO_2 בכל אחד מן המכלים הייתה זהה. בסוף הניסוי בדק החוקר את כמות ה- CO_2 בכל מכל, והישב את אחוז השינוי בכמות ה- CO_2 במכל ביחס לכמותו ההתחלתית. מהלך הניסוי ותוצאות הניסוי מוצגים בטבלה ש לפניכם.

המכל	חלק הצמח	צבע האור	אחוז השינוי בכמות ה- CO_2 במכל ביחס לכמותו ההתחלתית	התוצאות:
א	עלים	אדום	- 80	
ב	עלים	ירוק	- 10	
ג	גביעול	אדום	- 20	
ד	שורש	אדום	+ 20	

הסביר את התוצאות שהתקבלו בכל אחד מן המכלים א-ד. בתשובתך תתייחס לתהליכיים שימושיים על כמות ה- CO_2 במכל. (15 נקודות)

9. ענה על אחד מהשאלות 9-10.

9. בתהליך הפוטוסינזה יש שני שלבים:

שלב א: קליטת האור

שלב ב: קיבוע ה- CO_2

א. ציין את התוצרים של כל אחד מן השלבים א-ב. (8 נקודות)

ב. העבירו לחושך צמח שהיה באור. האם בחושך ימשך קיבוע ה- CO_2 ? נמק. (7 נקודות)

10. הכניסו תאי שמורים לכלי המכל מים, חמצן ומעט מאוד גליקוז. סגרו את הכליל ומדדו את כמות החמצן בתרחיף השמורים שבכל, ונמצא כי היא ירדה בקצב אטי.

כעבור שעה מתחילה המדידה הוסיפה לתרחיף תמייסט גליקוז, ובשעה השנייה נמצא שכךות החמצן ירדה בקצב מהיר לעומת השעה הראשונה.

א. הסביר את השינויים בכמות החמצן בכל במהלך השעה הראשונה ובמהלך השעה השנייה מתחילה המדידה. (8 נקודות)

ב. מדדו גם את הטמפרטורה בתרחיף. קבע אם נמצא הבדל בין הטמפרטורה שנמדדה בסוף השעה הראשונה ובין הטמפרטורה שנמדדה בסוף השעה השנייה. נמק את קביעותך.

(7 נקודות)

עונה על אחת מהשאלות 11-12.

11. כדי לבדוק מה הם התנאים המיטביים (האופטימליים) הנדרשים לפירוק שומנים לחומצות שומן ולגлицרול ערכו ניסוי: לכל אחת מ-4 מבחנות המכילות מים הוסיפו אותן כמויות של חומרים, על פי הפירוט בטבלה שלפניך.

הסימן (+) מציין שהחומר הוסיף ל מבחנה, הסימן (-) מציין שהחומר לא הוסיף ל מבחנה.
דרגת ה- H_c בכל התמיסות במבחנות הייתה 7.

המבחן	שומן	האנזים ליפאז	מלחיתمرة
1	+	-	+
2	+	+	-
3	+	+	+
4	+	-	-

- א. דרגי את המבחנות 1-4 לפי קצב הפירוק: החל מן המבחן שבתא קצב הפירוק היה המייבר ביותר, עד למבחן שלא התרחש בה כלל פירוק (אפשר להציב שתי מבחנות באוותה הדרגה). נקף את תשובה. בתשובתך תתייחס להשפעה של כל אחד מן החומרים על קצב הפירוק. (8 נקודות)
- ב. בניסוי אחר בדקנו פירוק של חלבונים כמו זה שמתרחש בקיבה. אילו חומרים יש להכניס למבחן כדי לקבל פירוק מיטבי? (7 נקודות)

12. תפוח אדמה מכיל כמות רבה מאוד של עמילן. אדם אכל תפוח אדמה, וזמן-מה מה לאחר הגעת המזון לאיברים השונים במערכת העיכול נבדקה כמות הגלוקוז והעמילן בכל אחד מן האיברים. תוצאות הבדיקה מוצגות בטבלה שלפניך.

האיבר	הכמות היחסית		
	המעי הדק	קייה	פה
גליקוז	עמילן	עמילן	גליקוז
+-	+++		+
+-	+++		+
++	+		++
+-	+ -		המעי הגס

מקרה:
כמות מעטה מאוד
+
כמות מעטה
+
כמות בינונית
++
כמות רבה
+++
כמות רבה מאוד
++++

הסביר את התהליכים שהתרחשו בכל אחד מאיברי העיכול וגרמו לשינויים בכמות העמילן והגלוקוז לאורך מערכת העיכול. (15 נקודות)
(המשך בעמוד 8)

נושא III – תורשה

עונה על ארבע שאלות:

על שתי השאלות 13-14 (חוּבָה), על אתת מהשאלות 15-16 ועל אתת מהשאלות 17-18.

עונה על שתי השאלות 13-14 (חוּבָה).

13. המופיליה היא מחלת הנגרמת בגל פגם בגן בכרומוזום X.

אנמיה חרמשית היא מחלת הנגרמת בגל פגם בגן באוטוזום.

שני הורים בראים נולד בן חוליה באנמיה חרמשית וגם בהמופיליה.

א. מהו הגנטיפ של כל אחד מן הורים? (התיחס לגנים של שתי המחלות שהזוכרו.)

הוסף מקרה, ונמק את תשובהך. (6 נקודות)

ב. מהו הסיכוי שלהורים אלה תיולד בת חוליה באנמיה חרמשית וגם בהמופיליה? נמק.

(6 נקודות)

14. א. הסבר כיצד נגרמת תסמונת דאון. (8 נקודות)

לזוג הורים, אחד מהם לוקה בתסמונת דאון והאחר אינו לוקה בתסמונת דאון, נולד צאצא

האם יתכן שהצאצא לא לוקה בתסמונת דאון? נמק. (7 נקודות)

ענה על אחת מהתוצאות 15-16.

15. המוגולוביון הוא חלבון הבנוי מרבע שרשורת של חומצות אמינוות.

יש כמה סוגים של שרשרות, כל סוג של שרשרת נקבע על ידי גן אחר.

א. בטבלה שלפניך מוצג מידע בנוגע לשרשורת של חומצות אמינוות ולכמותם במוגולוביון

של אדם, בשלבי התפתחות שונים (מעבר עד בוגר).

כמות השרשות				סוג השרשת	שלב ההתפתחות
גמא (γ)	בטא (β)	אלפא (α)			
2	—	2		עבור בגיל 4 חודשים	
1	1	2		ילוד (תינוק בן יומו)	
—	2	2		תינוק בגיל 6 חודשים ואדם בוגר	

האם המידע שבטבלה מגדים בקרה על ביטוי גנים? הסבר את תשובתך. (8 נקודות)

ב. לחולים באנמיה חרמשית יש בשרשרת בטא (β) חומצה אמינית אחת השונה מזו

ששבני אדם בריאים.

האם באמצעות בדיקת ה- DNA של תא עובר אפשר לקבוע אם העובר חולה

באנמיה חרמשית? נמק את תשובתך. (7 נקודות)

16. בכל אחד מותאי צמח תירס יש 20 כרומוזומים, ובכל אחד מותאי צמח אפונה יש 14 כרומוזומים.

א. כמה כרומוזומים יש בכל תא זויג (גטטה) של תירס, וכמה — בכל תא זויג של אפונה?

نمוק. (4 נקודות)

ב. צפוי שבין היצאים של רביה זויגית (מינית) בתירס תהיה שונות גדולה מזו שתתקבל

אצל יצאי רביה זויגית באפונה.

ציין שתי סיבות להבדל בשונות, והסביר כל אחת מהן. (11 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 17-18.

17. בהנדסה גנטית משתמשים בשני סוגים של נشاءים להעברה של חומר תורשתי.

א. בחר באחד מסוגי הנشاءים, וציין **יתרונו אחד וחיסドונו אחד** של השימוש בנשא מסווג זה.

(8 נקודות)

קורין עכבייש בנויים מחלבון מסוים שמקנה להם חוזק רב. אפשר להשתמש בחלבון זה

ב.

למטרות רבות, לדוגמה לייצור חוטים לשימוש רפואי.

באמצעות הנדסה גנטית אפשר להציג לתאים של עז את הגן של העכבייש, הקובע את ייצור החלבון.

הסביר כיצד וזו לאחדות של החומר התורשתי ולדרך שבה הוא מرتبط, מיוצר

בתאי העז חלבון שמקורו בעכבייש. (7 נקודות)

18. חוקרים זיהו את הגן שהتوزר שלו משתתף בבנייה של ליפיד (מולקולת שומן) מסוים

בקром התא.

תאר בקצרה את רצף האירופים שתחלתו בגן וסיומו ביצירת הליפיד. (15 נקודות)

פרק שני (40 נקודות)

בפרק זה שאלות ארבעה נושאים: רבייה; מיקרואורגניזמים; אבלוציה וטיפוח; ביוטכנולוגיה.
עליך לבחור בנושא אחד ולענות בו על שלוש שאלות, על פי הנחיות המפורטות בנושא שבחרת.

נושא IV – רבייה

ענה על שלוש שאלות:


על שאלה 19 (חויה), על אחד מהשאלות 20-21 ועל אחד מהשאלות 22-23.

ענה על שאלה 19 (חויה).

19. לפניה תרשים המתאר את הבקרה ההורמונלית בגוף האישה במהלך מחזור הווסת (מחוזר חודשי שלם).

כל אחת מן האותיות א, ב, ג, ד בתרשימים מייצגת איבר אחר.

כל אחת מן הספרות 1, 2, 3, 4 בתרשימים מייצגת הורמון אחר.



א. (1) ציין את האיבר שמייצגת כל אחת מן האותיות א-ד, ואת ההורמון שמייצגת

כל אחת מן הספרות 1-4.

(2) תאר את ההשפעה של כל אחד מן ההורמוניים 1 ו 2 על השינויים החלים

באיבר ג במחצית הראשונה של מחזור הווסת (ימים 1 עד 14, ובכללם היום ה-14).

(8 נקודות)

ב. הסבר כיצד רצף האירועים במחצית השנייה של מחזור הווסת (החל מן הביווץ) גורם

לDIMOM הווסת. (7 נקודות)

/המשך בעמוד 12/

עונה על אחת מהשאלות 20-21.

- .20. א. ציין והסביר שני גורמים שיכולים להגביל את קצב הרבייה של בעלי חיים. (7 נקודות)
ב. ציין שני הבדלים בין שתי אסטרטגיות רבייה המוכרות בבעלי חיים. (6 נקודות)

.21. גברים הסובלים ממתסמנות קלמן (Kallmann) אינם מתבגרים מינית והם עקרים.

- א. גברים שסובלים ממתסמנות זו ויתופלו בשילוב ההורמוניים FSH ו LH, יהיו פוריים. הסב
(8 נקודות)
ב. ציין שלושה סימני מין משניים שונים בזכר, והסביר מדוע אצל גברים הסובלים
מתסמנות קלמן לא מותפתחים הסימנים האלה. (5 נקודות)

עונה על אחת מהשאלות 22-23.

- .22. א. לזרעים יש מאפיינים המאפשרים את התפתחות הזרעים לצמחים.
ציין והסביר שניים מהם. (7 נקודות)
ב. מהי תרדרמת זרעים? הסביר את החשיבות של שלב התרדרמה לצמחים חד-שנתיים
הגדלים בארץ. (5 נקודות)

.23. לפניה דרישמה של מושגים ותהליכיים הקשורים ברבייה בצמחים:

- צמיחת נחשות, ייחור, יצירת גרגרי אבקה, בצל, הפריה, האבקה, יצירת פרי, מיוזה.
א. קבוע בונגע כל אחד מן המושגים והתהליכיים שברשימה אם הוא קשור לרבייה זוויגית
או לרבייה אל-זוויגית. (5 נקודות)
ב. רשום את המושגים והתהליכיים הקשורים לרבייה זוויגית בלבד, שמיינת בסעיף א,
בסדר הנכון של התרחשותם בתהליך הרבייה. הסביר בקצרה את הקשר ביניהם.
(7 נקודות)

נושא V — מיקרואורגניזמים

ענה על שלוש שאלות:

על שאלה 24 (חובה), על אתת מהשאלות 25-26 ועל אתת מהשאלות 27-28.

ענה על שאלה 24 (חובה).

24. יש חיידקים, לדוגמה החידק מיקויבריו (*Micavibrio*), הנצמדים לתאים, מפרישים לתוכם אנזימים המזרזים פירוק של חומרים בתא, ומונצלים את תוצרת הפירוק.

חוקרים רצו לבדוק אם אפשר להשתמש בחידקים הנצמדים כדי לפגוע בחידקים פטוגניים שעמידים לתרופה, לדוגמה החידק פסאודומונס (*Pseudomonas*).

החוקרים גידלו חיידקי פסאודומונס במצע גידול נוזלי בתנאים אוירניים (אEROBIC).

בשלב הגידול המעריצי הוסיףו למצע הגידול גם חיידקי מיקויבריו. כעבור 48 שעות בדקו את מספר חיידקי פסאודומונס החיים שנותרו במצע הגידול, ומצאו שמספרם ירד רידעה ניכרת.

א. מה הם יחסיו הגומלין בין חיידקי המיקויבריו לחידקי הפסאודומונס? נמק. (7 נקודות)

ב. חזרו על אותו הניסוי אך בתנאים אל-אוירניים (אEROBIC), ונמצאו כי לאחר 48 שעות מספר חיידקי הפסאודומונס לא ירד.

מה אפשר ללמוד מן הממצא זהה על הדרך שבה חיידק המיקויבריו מפיק אנרגיה? הסבר.

(8 נקודות)

עונה על אחת מהשאלות 25-26.

25. הנגיף HIV, הגורם למחלת הכש החיסוני הנרכש (איידס), הוא נגיף מסוג רטרוירוס.

אחת האפשרויות לטפל במחלת זו היא באמצעות החומר AZT (איזידוטימידין).

המבנה של החומר AZT דומה מאוד למבנה של תימידין (T), שהוא אחד הנוקלאוטידים

ב-DNA. בנווכחות AZT משתבשת הבנייה של מולקולות ה-DNA.


צין את השלבים בהתרבות הנגיף HIV, והסביר מדוע אפשר להשתמש ב-AZT לטיפול במקרה?

(13 נקודות)

26. בניסוי גידלו חידקים במצע גידול דל, ובשלב הגידול המעריצי העבירו אותם למצע גידול עשן מזמן ההעברה ואילך בדקו את מספר החידקים בתרביה ואת הכמות היחסית של מרכיבים (DNA, RNA, חלבון) בתאי החידקים. הגראף שפניך מתאר את השינוי במספר החידקים במשך 100 דקות.

השינוי במספר החידקים במשך הזמן לאחר שהועברו למצע גידול עשיר

**לוגריתם של
מספר החידקים במייל**



בבדיקה של מרכיבי התאים במשך 60 דקות לאחר ההעברה מצאו כי תחילת עלתה כזו

ה-DNA, אחר כך עלתה כמות החלבונים, ולאחר מכן עלתה כמות ה-DNA.

הסביר כיצד העלייה בכמות של מרכיבי התא בסדר זה מאפשרת את השינוי במספר ה-

המתואර בגראף. (13 נקודות)

/המשך

עה על אחת מהשאלות 27-28.

27. חיידי *E. coli* יכולים להתקיים ולהתרבות על מצע המכיל מלחים וגולוקוז בלבד.

את הוויטמינים A ו- B החינויים לקיוםם הם מייצרים בעצמם.

חיידי *E. coli* נחשפו לקרינה המעלת את הסיכוי למוטציות. בעקבות זאת נוצרו שני זנים של מוטנטים (פרטים שעברו מוטציה).

מוטנט 1: חיידיים שאינם יכולים להתקיים בלי ויטמין A במאצע.

מוטנט 2: חיידיים שאינם יכולים להתקיים בלי ויטמין B במאצע.

כשגידלו את שני הזנים המוטנטים יחד על מצע מזון המכיל מלחים וגולוקוז בלבד, נמצא כי חלק מן החיידיים הצליחה להתרבות.

צין מהו התהליך שאפשר לחידיים האלה להתקיים ולהתרבות. תאר את התהליך.

ה

(12 נקודות)

28. מחלת הגחלת (אנטרכס) פוגעת בחיות משק. בدم של בקר חולה בגחלת נמצא חיידק החשוב

שהוא הגורם למחלת.

תאר את שלבי התהליך שיש לבצע, כדי לבדוק אם החידק החשוב הוא הגורם למחלת הגחלת.

(12 נקודות)

/המשך בעמוד 16/

ה

/15

נושא VI – אבולוציה וטיפוח

ענה על שלוש שאלות:

על שאלה 29 (חובה), על אתת מהשאלות 30-31 ועל אתת מהשאלות 32-33.

ענה על שאלה 29 (חובה).

לפני כ-15 שנים התחלו לגדול בארצות-הברית צמחי כותנה טרנסגנרים המיצרים את החומר Bt. החומר Bt הוא קוטל חרקים המגן על הצמחים מפני אכילתם על ידי חרקים. יצירת חומר זה נקבעת על ידי גן שמקורה בחידק מסוים. בשנים האחרונות הופיעו במדינת אריזונה חרקים מעטים שניזונו מצמחי הכותנה הטרנסגנרים, ולא נזוקו.

- א. האם ההופעה של החרקים האלה, שלא נזוקו, היא דוגמה למיקרואבולוציה או למקרו-אבולוציה?
نمך. (7 נקודות)
- ב. בפתח מתוארים שני תהליכי לא אקראיים. צין מה הם שני התהליכים, והסביר במה הם
שונים זה מזה. (8 נקודות)

ענה על אתת מהשאלות 30-31.

בעבר הרחוק היו כל הסלעים במדבריות אריזונה שבדרום ארצות-הברית בהרים, אך בשל זרמי קבה שנקרשו חלק מן הסלעים נעשו כהים. כיום באזורי הסלעים הבהירים חיים עכברים שפרוותם בהירה, ובאזורים הסלעים הכהים – עכברים שפרוותם כהה. חוקרם גילו שלכל העכברים הכהים יש מوطציה בגן מסוים (Aclr), הגורמת להופעת הצבע הכהה. כיצד אפשר להסביר את הימצאותם של עכבריםים כהים באזור של סלעים בהרים ואת הימצאותם של עכבריםים כהים באזור של סלעים כהים? (12 נקודות)

31. חפרפרת היא יונק חוי מתחת לפני הקרקע. בסוג חפרפרת יש מינים הנבדלים זה מזו במגוון תכונות. כל אחד מן המינים נפוץ באזור אחר בעולם (באירופה, בצפון אמריקה ובמזרח אסיה), שתנאי הסביבה בו שונים. מהו ההסבר האפשרי לכך שיש מינים שונים של חפרפרות באזורים בעולם השונים בתנאי הסביבה שלהם? (12 נקודות)

עונה על **אחת** מהשאלות 32-33.

32. בוגר לטאורה של למרק כתוב דרוין את המשפט: "המסקנות שהגעתי אליו אין שונות הרבה משלו (של למרק), אף על פי שהמנגנונים שונים זה מזה כמעט בעיקרם".
ציין נקודת אחת שבה התאורה שהציג למרק דומה לטאורה של דארווין בוגר להתרפות המינים, ונקודות שוני בינהן. (13 נקודות).

33. לפני כמה שנים התגלו באירופה (יוון) שרידים של יונק. תחילת חשבו שהיונק הוא פיל קדום, אך לאחר בדיקה, המבוססת על אנטומיה משווה, ומאותר יותר באמצעות בדיקות ברמה המולקולרית, הגיעו חוקרים למסקנה שמדובר בממותה ננסית (משפחה הפיליים).
ציין איזו משתי הבדיקות שביצעו החוקרים מספקת עדות מוצקה יותר למסקנתם, והסביר את העיקרון שהבדיקה שציינית מבוססת עליו. (13 נקודות)

נושא VII — ביוטכנולוגיה

ענה על שלוש שאלות:

על שאלה 34 (חוּבָה), על אחת מהשאלות 35-36 ועל אחת מהשאלות 37-38.

ענה על שאלה 34 (חוּבָה).


34. באמצעות חידקים אפשר לייצר דלק ביולוגי מצמחים. לשם ייצור דלק כזה נבנו ארבעה פלסמידים, ואליהם הוחדרו גנים שונים, כמפורט בטבלה שפנוי.

הפלסמיד	הגנים שהוחדרו לפלסמיד
פ-תאית	צלולאז, בטא-גלקטוזידاز, עמידות ל垦מיצין
פ-חומצת שומן	6 גנים מאופרין יצרת חומצת שומן, עמידות לכליורומפניקול
פ-בוטנול	7 גנים מאופרין יצרת בוטנול, עמידות לכליורומפניקול
פ-פין	8 גנים מאופרין יצרת פין, עמידות לכליורומפניקול

- א. קבע אילו מן הפלאסמידים המוצגים בטבלה יש להגדיר לחידק כדי שיוכל לייצר בוטנול.
נמק את קביעתך. (8 נקודות)
- ב. הסבר מה היה קורה אילו בכל הפלאסמידים היה גן עמידות לאוותה אנטיביוטיקה.
(7 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 35-36.

- .35. אפשר לייצר דלק ביולוגי באמצעות חיידקי *E.coli* מהומנדים. את החידקים האלה מגדלים על מצע של דוחן מטופל.
- א. הסבר מהי החשיבות של הטיפול שמתבצע בדוחן, לפני שמגדלים עליו את החידקים.
- ב. לפניו גרען ובו שני עוקומים I-II, המתארים את הגדול של חיידקי *E.coli* מזון הבקר וחיידקים מהומנדים מאותו המין, על מצע של דוחן מטופל.

מספר החידקים/ מ"ל 

קבעו איזה מן העוקומים I או II מתאר את גידול החידקים מהומנדים, ואיזה מהם מתאר את גידול החידקים מזון הבקר. נמק. (7 נקודות)

- .36. א. תאר שתי בדיקות שבאמצעותן אפשר לקבוע אם חיידקים, שהוחדר להם הגן לייצור האנזים צלאלאז, מבטאים כן זה. (7 נקודות)

ב. בתהליך ייצור תעשייתי יש חשיבות שלחידק המהומנד תהייה יציבות גנטית.

במאמר "חידקים מהומנדים מייצרים דלק ביולוגי מעשבים" מתואר חידק המייצר בוטנוול. הסבר את הסיבה לכך שהחידק זה אינו יכול מבחינה גנטית. (6 נקודות)

/המשך בעמוד 20/

ענה על אחת מהשאלות 37-38.

37. בוגרים של החולים במחלה ADA SCID חסר האנזים אדנוזין דאמינוא. אפשר להנדס חידקים שיצרו אנזים זה, ולהזריק אותו לחולים.

א. האם הפלסמיד שיחדרו לחידק כדי שייצר את האנזים שיזריקו לחולים צריך להכיל DNA או DNA משלים (cDNA)? נמק. (6 נקודות)

ב. צין תרנן אחד ומיסרונ אחד בריפוי חולים באמצעות הזורקת האנזים לעומת רפואי גני. (6 נקודות)

38. לצורך רפואי גני של חולות במחלה ADA SCID השתמשו החוקרים בנשא שהוא רטrozירוס.

א. תאר את התהליך של הכננת הנשא. (6 נקודות)

ב. מהי הבועה שיכולה להתעורר כשנעוזרים בנגיף (ווירוס) המשמש נשא להחדרת גן לתאים? (6 נקודות)

בצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך