

סוג הבדיקה: א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים  
ב. בגרות לנבחנים חיצוניים  
מועד הבדיקה: קיץ תשע"ד, 2014  
מספר השאלה: 27,037303  
מספר השאלון: (1) גילין תשובות  
(2) הטבלה המחזורית  
(3) טבלתALKטרושלליות  
(4) טבלת נוסחאות

## כימיה

3 ייחדות לימוד

### הוראות לנבחן

- א. משרף הבדיקה: שלוש שעות.
- ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה: בשאלון זה שני פרקים.  
פרק ראשון – חובה – – (20x2) – 40 נקודות  
פרק שני – – (20x3) – 60 נקודות  
סה"כ – 100 נקודות
- ג. חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון (כולל מחשבון גרפי).
- ד. הוראות מיוחדות: (1) **שים לב:** בשאלת 1 שבפרק הראשון יש שמונה סעיפים א-ח. לכל סעיף מוגנות ארבע תשובות, ומהן עליך לבחור בתשובה הנכונה. את התשובות הנכונות עליך לסמן בגילון התשובות.  
(2) **הדק את גיליון התשובות מהברת הבדיקה.**  
(3) **בפרק הראשון יש לענות על שתי השאלות,** ובפרק השני יש לענות על שלוש מ בין ששה שאלות.
- כתוב במחברת הבדיקה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב בטויפן (ראשי פרקים, חישובים וכדומה).  
רישום "טיפה" בראש כל עמוד טיפה. רישום טיפות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבדיקה עלול לגרום לפסילת הבדיקה!
- הנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולນבחנים כאחד.**

**ה שאלות****פרק ראשון (40 נקודות)**

ענה על שתי השאלות 1 ו 2 (לכל שאלה – 20 נקודות).

1. ענה על בל הסעיפים א-ח ב吉利ון התשובות המצורף (לכל סעיף – 2.5 נקודות).  
בכל סעיף הקיף במעגל את הספרה המציינת את התשובה הנכונה.  
לפני שתענה, קרא את כל התשובות המוצגות.

- a. האותיות a, b, c, d מסמלות אטומים של ארבעה יסודות הנמצאים באוותה שורה בטבלה המחותרת.  
בטבלה שלפניך מוצג מספר אלקטרוני הערכיות באטומים אלה.

מספר אלקטרוני הערכיות	האטום
1	a
2	b
6	c
7	d

מהי הקביעה הנכונה?

1. הרדיוס של אטום a גדול מהרדיוס של אטום b.
2. אטום b יכול להתקשר לאטום c בקשר קוולנטי כפול.
3. אנרגיית היינון של אטום c גבוהה מאנרגיית היינון של אטום d.
4. הערכות האלקטרוניים באטום d היא 2, 5.

ב. לפניך ארבעה היגדים הנוגעים לקשרים קוולנטיים.

מהו החידד הנכון?

1. אורך הקשר  $C=C$  שווה לאורך הקשר  $O=O$ .
2. אורך הקשר  $H-C-H$  שווה לאורך הקשר  $H-N$ .
3. אנרגיית הקשר  $C=C$  גדולה מאנרגיית הקשר  $C-C$ .
4. אנרגיית הקשר  $C \equiv C$  גדולה מאנרגיית הקשר  $N \equiv N$ .

למולקולת מותאנאל,  $\text{OCH}_2$ , צורה מישורית משולשת.

לפניך שלושה היגדים, I-III :

- I. דרגת החמצון של אטום הפחמן במולקולה  $\text{CH}_2\text{O}$  היא אפס.
- II. במולקולה  $\text{CH}_2\text{O}$  יש דורךוטב קבוע.
- III. בחומר  $\text{CH}_2\text{O}$  יש קשרי מימן בין המולקולות.

מה הם ההיגדים הנכונים?

1. I ו II בלבד.
2. I ו III בלבד.
3. II ו III בלבד.
4. I, II ו III.

7. במעבדה ובתעשייה מפיקים ברום,  $\text{Br}_2(\ell)$ , על פי התגובה:



لتוך 200 מ"ל תמיסה מימית שהכילתה יוני ברום,  $\text{Br}^-(\text{aq})$ , הזרמו 500 מ"ל גז כלור,  $\text{Cl}_2(\text{g})$ . החומרים הגיעו בשלמות. בתנאי התגובה הנפח של 1 מול גז היה 25 ליטר.

מהו הריכוז של יוני  $\text{Cl}^-(\text{aq})$  בתום התגובה?

- |          |    |
|----------|----|
| 0.02 M   | .1 |
| 0.0285 M | .2 |
| 0.1 M    | .3 |
| 0.2 M    | .4 |

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.)


/המשך בעמוד 4/

ה. 60 מ"ל אמונייה,  $\text{NH}_3(\text{g})$ , היגבו בשלמות עם 60 מ"ל חמצן,  $\text{O}_2(\text{g})$ . התקבלו 90 מ"ל אדי מים,  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ , ו- 30 מ"ל של גז נוסף. כל הנפחים נמדדו באותו תנאים של טמפרטורה ולחץ.

מהו הגז הנוסף שהתקבל בתגובה?

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| $\text{N}_2(\text{g})$         | .1 |
| $\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ | .2 |
| $\text{NO}(\text{g})$          | .3 |
| $\text{NO}_2(\text{g})$        | .4 |

ו. נתונות ארבע מותכות המדרוגות לפי הקשר היחסי שלחן לחוב:






בטבלה ש לפניו מידע על ארבעה ניסויים, a-d, שבוצעו במעבדה. בכל ניסוי טבלו פס מותכת בתמיסה מימית שהכילה יוני מותכת.

$\text{Cd}_{(\text{s})}$	$\text{Ni}_{(\text{s})}$	$\text{Pb}_{(\text{s})}$	$\text{Ag}_{(\text{s})}$	הмотכת	
				יוני המותכת	יוני המותכת
			a	$\text{Ag}^+(\text{aq})$	
	b			$\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$	
c				$\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$	
		d		$\text{Cd}^{2+}(\text{aq})$	

באילו מה ניסויים התרחשה תגובה?

1. a ו- d בלבד.
2. b ו- c בלבד.
3. b ו- d בלבד.
4. a ו- c בלבד.


. ב. לפניך ניסוחים של שלוש תגובהות (1)-(3):



מהי הקביעה הנכונה?

1. בתגובה (1) מגביב  $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$  חומצה.
2. בתגובה (2) מגביב  $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$  כבסיס.
3. כאשר מכניםים למים  $\text{K}_2\text{CO}_{3(s)}$ , מתקבלת תמיישה שה- $\text{H}^-$  pH שלה קטן מ-7.
4. כאשר מזרימים  $\text{CO}_{2(g)}$  לתוך תמישת סיון הידרוקסידי,  $\text{Ca}(\text{OH})_{2(aq)}$ , ה- $\text{H}^-$  pH של התמיישה יורד.

ח. לפניך יציג מקוצר לנוסחת המבנה של חומצה גלוטמית.




מהו המשפט הנכון?

1. הנוסחה המולקולרית של חומצה גלוטמית היא  $\text{C}_5\text{H}_4\text{NO}_4$ .
2. בנוסחת המבנה של חומצה גלוטמית, הקבוצה הצדדית, R, היא  $\text{COOH}$ .
3. בתמיישה מינית, ב- $\text{pH} = 7$ , המטען הכלול על חלקיקי החומצה הגלוטמית הוא (-).
4. חומצה גלוטמית היא נוזל בטמפרטורת החדר.

/המשר בעמוד 6/

גיתות קטוע ממאמור מדעי – חובה

2. קרא את הקטע שלפניך, וענה על כל השיעיפים א-ד שאחריו.

**"דלק יירוק" ממצאות**

בשלהי של דלקים כמו נפט ופחם נפלט פחמן דו-חמצני,  $\text{CO}_{2(g)}$ . יש מדענים הסבירים כי עליה בריכוז של  $\text{CO}_{2(g)}$  באטמוספירה גורמות, בין היתר, לשינויי אקלים ולעליה בחומציות של מי הים.  $\text{CO}_{2(g)}$  מגיב עם מים,  $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ , על פי התגובה:



מדענים מנסים למצוא דרכם לצמצום הכמות של  $\text{CO}_{2(g)}$  הנפלטות לאטמוספירה. אחת הדרכים היא גידול אצות זירות הקולוטות  $\text{CO}_{2(g)}$  ומנצלות אותו לייצור תרכובות פחמן. שיטה זו מכונה ביוקונברסיה.

בספרד פועל מתקן ניסיוני שמזרימים בו  $\text{CO}_{2(g)}$  שנפלט מאדרובות של מפעל מלט, תוך צינורות זוכחים המכילים מים ואצות זירות. בהשפעתה של קרינה השמש האצות מתרבבות במהירות, ומפיקים מהן תעבורת של תרכובות פחמן הדומה בתכונות הבערה שלה לנפט. תעבורת זו היא "דלק יירוק", מכיוון שבעת שרפתה לא נפלטים לאויר חומרים מזוהמים כמו אלה הנפלטים בשרפתי נפט או פחם. התעborות נוצרת במתקן הניסיוני במשך 48 שעות, לעומת הנפט בטבע שהיווצרותנו נמשכת מיליון שנים.

גם בישראל הוקם מתקן הפועל בשיטת הביוקונברסיה. המתקן נמצא באשקלון, ליד תחנת הכוח להפקת חשמל המופעל על ידי שרפת פחם,  $\text{C}_{(s)}$ .

במתקן זה מזרים את ה-  $\text{CO}_{2(g)}$  שנוצר בשרפתי הפחם תוך ברכות מי ים שבו אצות זירות, האצות קולוטות  $\text{CO}_{2(g)}$  ומתרבבות במהירות. ממצאות אלה מפיקים חומצות שומן מסווג אומגה-3, ומהן מכינים תוסף תזונה.

בישראל מקווים שבעתיד יהיה אפשר ליצר בשיטת הביוקונברסיה גם "דלק יירוק".

(מעובד על פי: מילן גריינפטר, "פתרון למחסור בנפט ולביעיית שינוי האקלים", אפקט טימס ישראל, מאי 2011)

a. הנח שבתוצאות הכוח בישראל המופעלות על ידי פחם נשרפים בכל שעה 1620 טון פחם,  $C_{(s)}$ , בחמצן,  $O_2(g)$ , שבօיר.

i. נסח את תגובת השרפָה של פחם.

ii. ב- 1 טון יש  $1,000,000$  גרם ( $10^6$  גרם).

כמה מול פחם נשרף בכל שעה בתוצאות הכוח אלה? פרט את חישוביך.


iii. מהי היחסה של  $CO_2(g)$  שנפלטה לאטמוספָרה בכל שעה מהתוצאות הכוח אלה?  
פרט את חישוביך.

b. על פי המידע שבקטע, צין שני יתרונות לשימוש בשיטת הביו-וונברסיה.

c. לשתי ברכות, שהכילו אותו נפח של מים, הזרימו  $CO_2(g)$  באותו קצב.

רק באחת מהברכות היו אצות. שאר התנאים היו זהים.

אייזה מהגרפים I-III שלפניך מתאר את שינוי ה- $pH$  של מים עם הזמן, בכל אחת מהברכות? نمך.



i. בمولקולת של אחת מהומצאות השומן מסווג אומגה 3 המופקות מאצוט יש 20 אטומי פחמן ו- 5 קשרים כפולים, כולל במבנה ציס.

כתוב בשימוש מקוצר לחומרת שומן זו.

ii. באחד שלבים בתחילת הפיקת חומצאות השומן מן האצוט משתמשים בממיס.

אייזה מן הממסים — מים,  $H_2O(l)$ , או הקסאן,  $C_6H_{14}(l)$  — מתאים להמסת חומצאות השומן? הסביר.

/המשר בעמוד 8/


**פרק שני (60 נקודות)**

ענה על שלוש מהשאלות-3-8 (לכל שאלה – 20 נקודות).

**מבנה האטום, קישור ותכונות של חומרים**

3. תירוקסין הוא הורמן המופרש על ידי בלוטת התיריס, ותפקידו לווסת קצב חילוף חומרים בגוף.

א. לפנייך יציג מוקוצר לנוסחת המבנה של תירוקסין.



במולקולה של תירוקסין יש 4 אטומי חמצן, O, בקבוצות פונקציונליות שונות.

רשום את הנוסחה של כל אחת מן הקבוצות הפונקציונליות האלה, וציין את השם של כל קבוצה.

ב. ברפואה מבחנים בעיות בפיגמות של בלוטת התיריס באמצעות יוד רדיואקטיבי.

ו. בטבלה ש לפניה מידע חלקית על שני איזוטופים רדיואקטיביים של יוד, I.

העתק את הטבלה למחברת הבדיקה והשלם אותה.

מספר נויטרונים	מספר אלקטרונים	מספר פרוטונים	מספר מסה אטומי	מספר מסה האיזוטופ	סימול האיזוטופ
70					$^{131}\text{I}$

ii. איזוטופ  $^{131}\text{I}$  פולט קרינה רדיואקטיבית והואך ל-  $^{131}\text{Xe}$


מהו סוג הקרן הרדיאקטיבית הנפלטת, α או β ? נק.

- בתנאי החדר היסוד יוד,  $I_{2(s)}$ , הוא מוצק שצבעו סגול אפור. בניסוי שבוצע במעבדה הכנסו לכל אחת משתי מבחנות (1)-(2) גבישים של  $I_{2(s)}$ .
- למבחן (1) הוסיפו 1-פרופאנול,  $C_3H_7OH(l)$ .
- למבחן (2) הוסיפו מים,  $H_2O(l)$ .
- רק באחת משתי המבחנות התקבלה תערובת הומוגנית.
- קבע באיזו מבחנה (1) או (2), התקבלה תערובת הומוגנית.
  - תאר ברמה מיקרוסקופית את התערובת הומוגנית שהתקבל.
  - נסח את התהליך לקבלת התערובת הומוגנית.

7. בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על 1-פרופאנול ואצטון.

החומרים	הנוסחה המולקולרית	נוסחת המבנה	טמפרטורת הרתיחה ( $^{\circ}C$ )
1-פרופאנול	$C_3H_8O$	$CH_3-CH_2-CH_2-OH$	97
אצטון	$C_3H_6O$	?	57

נתונות שתי נוסחאות מבנה, A ו- B.





קבע איזו מהנוסחאות, A או B, היא נוסחת המבנה של אצטון.

הסביר מדוע פסלת את הנוסחה האחרת.


/המשך בעמוד 10/

מבנה, קישור ותכונות של חומרים


.4. לפני ארבעה אירורים, a-d, המתארים בצורה סכמטית את המבנה של ארבעה מוצקים:




b



a



d



c

a. העתק את הטבלה ש לפניך למחברת הבדיקה, והשלם אותה.

האир	נוסחת המוצק המתואר באירור	סוג החלקיקים במוצק	סוג הקשרים בין החלקיקים במוצק
a			
b			
c			
d			

ב. הסבר מדוע מגנזיום,  $Mg_{(s)}$ , מוליך חשמל ואילו יהלום,  $C_{(s)}$ , אינו מוליך חשמל.

בתשובהך התיחס לבניה החומריים.

ג. אשלגן כלורי,  $KCl_{(s)}$ , מופק בישראל ממים ים המלח.

i אשלגן כלורי מתמוסס היטב במים. נסח את תהליך ההמסה במים של  $KCl_{(s)}$ .

ii תאר ברמה מיקרוסקופית תמיישה מימית של אשלגן כלורי.

ד. היגדים i-ii שלפניך עוסקים בשתי תרכובות של יוד:

מיימן יוד,  $Hg_{(g)}$ , יוד ברומי,  $IBr_{(s)}$ .

קבע עבור כל אחד מההיגדים i-ii אם הוא נכון או לא נכון. נקודות כל קביעה.

i המטען החלקי על אטומי יוד, I, הוא חיובי, גם ב מולקולת HI וגם ב מולקולת IBr.

ii בטמפרטורת החדר יוד ברומי הוא מוצק ואילו מיימן יוד הוא גז, זאת בשל ההבדל

בחזוק הקשרים הקולונטיים  $I-Br$  ו  $I-H$ .


/המשך בעמוד 12/

סטויוכיומטריה

5. השאלה עוסקת באמוניום ברומי,  $\text{NH}_4\text{Br}_{(s)}$ , המשמש חומר מעכבר בעריה למוצרי עץ.

אפשר להפיק  $\text{NH}_4\text{Br}_{(s)}$  מאמונייה,  $\text{NH}_3_{(g)}$ .

a. אמונייה,  $\text{NH}_3_{(g)}$ , מגיבה עם מימן ברומי,  $\text{HBr}_{(g)}$ , על פי תגובה (1):




חשב את המסה של  $\text{NH}_4\text{Br}_{(s)}$  שתתקבל בתגובה בין 336 מ"ל  $\text{NH}_3_{(g)}$  ובין נפח מתאים

של  $\text{HBr}_{(g)}$ . בתנאי התגובה הנפח של 1 מול גז הוא 22.4 ליטר. פרט את חישוביך.

b. אמונייה,  $\text{NH}_3_{(g)}$ , מגיבה עם ברום,  $\text{Br}_2_{(g)}$ , על פי תגובה (2).

לפניך ניסוח לא מאוזן של תגובה (2):



לכלי סגור הכניסו 240 מ"ל  $\text{Br}_2_{(g)}$  ונפח מתאים של  $\text{NH}_3_{(g)}$ . הגזים הגיעו בשלמות.

נוצרו 80 מ"ל חנקן,  $\text{N}_2_{(g)}$ , וכמויות מסוימות של  $\text{NH}_4\text{Br}_{(s)}$ .

הנפחים של כל הגזים נמדדו באותו תנאים של טמפרטורה ולחץ.

i. היעזר בנתונים ורשום ניסוח מאוזן לתגובה (2).

הסביר כיצד קבעת את המקדים בניסוח התגובה.


ii. מהו הנפח של  $\text{NH}_3_{(g)}$  שהגיע בתגובה זו? פרט את חישוביך.

iii. קבע אם במהלך התגובה הלחץ בכלי עלה, ירד או לא השתנה. ນמק.

iv. האם על פי הנתונים אפשר לחשב את מסת המוצק שהתקבל בתגובה (2)?

אם כן, חשב את מסת המוצק. אם לא, הסביר מדוע.


ג. לפניך ניסוח תהליך ההמסה במים של :  $\text{NH}_4\text{Br}_{(s)}$



במעבדה הכינו 300 מ"ל תמיסת, על ידי המסת  $\text{NH}_4\text{Br}_{(s)}$  במים.

لتמיסת זו הוסיפו 120 מ"ל תמיסת כסף חנקתי,  $\text{AgNO}_3_{(\text{aq})}$ , בריכוז 0.8M.

התראשה תגובה (4).



יוני  $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$  ויוני  $\text{Br}^-_{(\text{aq})}$  הגיבו בשלמות.

i. כמה מול יוני  $\text{Br}^-_{(\text{aq})}$  הגיבו עם יוני  $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$ ? פרט את חישובך.

ii. מהו הריכוז המולרי של תמיסת  $\text{NH}_4\text{Br}_{(\text{aq})}$  שהכינו במעבדה? פרט את חישובך.

/המשך בעמוד 14/

**המצון, חיזור וסטויביומטריה**


6. תרכובות המכילות יוני כרוםט,  $\text{CrO}_4^{2-}$ , משמשות בתעשייה היציפויים של מתרכות. יוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  הם רעלים, ולכן שפכים תעשייתיים המכילים יוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  חייבים לעבור טיפול לפני הזרמתם לביבום.

במהלך הטיפול במים השפכים יוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  הופכים לחלקיקים שבהם דרגת החמצון של אטומי Cr היא  $+3$ .

- A. i. האם לטיפול ביוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  נדרש חומר מלחמצן או חומר מתחזק? נק.  
ii. רק אחד משני החומרים, יוד,  $\text{I}_{2(s)}$  או פלאור,  $\text{F}_{2(g)}$ , יכול להתאים לטיפול ביוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  שבמי השפכים. קבע מהו החומר המתאים. נק.

5. אחת השיטות לטיפול ביוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  שבמי השפכים היא באמצעות תגובה עם גפרית דו-חמצנית,  $\text{SO}_{2(g)}$ .

יוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  מגיבים עם  $\text{SO}_{2(g)}$  על פי תגובה (1):






בתנאי התגובה הנפח של 1 מול גז הוא 25 ליטר.

כמה מול יוני  $\text{CrO}_4^{2-}$  מגיבים עם 150 ליטר  $\text{SO}_{2(g)}$ ? פרט את חישובך.

ג'. שיטה אחרת לטיפול ביוני  $\text{CrO}_{4(\text{aq})}^{2-}$  שבמי השפכים היא באמצעות תגובה עם ברזל,  $\text{Fe}_{(\text{s})}$ .

i. קבע איזה מבין שני הניסוחים (2)-(3) שלפניך הוא הניסוח הנכון של התגובה



ii. על פי ניסוח התגובה שבחרת בתשובהך לתת-סעיף ג.ו, חשב כמה מול אלקטרונים

עוורבים בתגובה שבה מגיבים 101 גרם  $\text{Fe}_{(\text{s})}$ . פרט את חישובך.

ד'. פלדות אל-חלד הן סגסוגות של ברזל,  $\text{Fe}_{(\text{s})}$ , המכילות לפחות 11.5% כרום,  $\text{Cr}_{(\text{s})}$ .

i. מהי דרגת החמצן של אטומי כרום בפלדות אל-חלד? نمתק.

ii. הchrom שבפלדת אל-חלד מגיב עם חמצן,  $\text{O}_{2(\text{g})}$ , המצוי באוויר. על פני הסגסוגת

נוצרת שכבה דקה של התרכובת  $\text{Cr}_2\text{O}_3(\text{s})$ , המקנה לסגסוגת עמידות בפני קורוזיה.

קבע אם בתהליך הייצור התרכזות, הchrom מגיב כמחזור או כמוחץ. نمתק.


/המשך בעמוד 16/

**חומרות ובסיסים וסטויכיומטריה**

7. בטבלה ש לפניך מוצגים נתוני על ארבע תמייסות ממויות (1)-(4).

ריכוז התמיסת (M)	נפח התמיסת (מ"ל)	נוסחת החומר שהוכנס למים	התמיסה
0.03	300	HBr <sub>(g)</sub>	(1)
0.02	200	H <sub>2</sub> SO <sub>4(l)</sub>	(2)
0.03	300	NaOH <sub>(s)</sub>	(3)
?	200	HI <sub>(g)</sub>	(4)

א. נסח את התהליך שmotrhoש כאשר מכניםים למים כל אחד משלושת החומרים:



ב. דרג את שלוש התמייסות (1)-(3) לפי pH, מהנמוך לגבוה.

ג. pH של תמיסת (4) שווה pH של תמיסת (2).

ה. קבע מהו הריכוז של תמיסת (4). נקודות.

ב. נ. ערביבו 200 מ"ל תמיסה (1) עם 100 מ"ל תמיסה (3).

צין את כל סוגיה הイונים בתמיסה שהתקבלה לאחר הערביוב. נק.



ii. ל- 100 מ"ל של תמיסה (1) הוסיפו תמייסת  $\text{NaBr}_{(\text{aq})}$ .  
ה-  $\text{H}^+$  של התמיסה שהתקבלה היה גובה מה-  $\text{H}^+$  של תמיסה (1). הסבר מדוע.

ג.

נוגדי חומצה משמשים תרופות הסותרות עודף חומציות בקיבה.

טבליה אחת של נוגד חומצה מסוים מכילה 0.2 גרם מגנזיום הידרוקסידי,  
 $\text{Mg(OH)}_{2(\text{s})}$  ו- 0.2 גרם אלומיניום הידרוקסידי, $\text{Al(OH)}_{3(\text{s})}$ .

כאשר נוגד חומצה זה בא במגע עם הסביבה החומצית שבקיבת מתרחשות התגובהות (1) ו- (2):



חשב את המספר הכללי של מול יוני  $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$  המגיבים עם טבליה אחת של נוגד חומצה זה.

פרט את חישובך.

/המשך בעמוד 18/

### כימיה של מזון


8. שמן זית הוא אחד משמניו המאכל הנפוצים ביותר בעולם, ובמיוחד באזור הים התיכון.

מרבית חומצות השומן שבשמן זית נמצאות בטריגליצרידים, ומקצתן מצויות כחומצות שומן חופשיות. בטבלה שלפניך מוצגות חומצות השומן העיקריות המצויות בשמן זית.

רישום מקוצר של חומצת השומן	חומצת השומן
C16: 0	חומצה פלמייטית
C18: 0	חומצה סטארית
C18: 1 $\omega$ 9, cis	חומצה אולאית
C18: 2 $\omega$ 6, cis, cis	חומצה לינולאית



a. טמפרטורת התיוך של חומצה לינולאית נמוכה מטמפרטורת התיוך של חומצה אולאית. הסבר מדוע.

b. לפניך ייצוג מקוצר לנוסחת המבנה של טריגליזיד המצוי בשמן זית.



היעזר בנתונים שבבלה וקבע מאילו חומצות שומן מורכב טריגליזיד זה.

c. שמן זית מכיל גם ויטמינים. לפניך שתי נוסחאות מבנה, I-II, של שני ויטמינים.




קבע איזו מהנוסחאות, I או II, מתאימה לוויטמין המצוי בשמן זית. נמק.

/המשך בעמוד 19/

לקחו דגימה של 20 גרם שמן זית והmisו אותה בכוהל מתאים. לתמיסה זו הוסיפו

תמיסת אשלגן הידרוקסידי,  $\text{KOH}_{(\text{aq})}$ .

חומצות השומן החותפשיות בשמן הזית הגיעו על פי התגובה:



R מסמל את שרשרת הפחמיינית במולקולה של חומצת השומן.

נדשו 8.5 מ"ל תמיסת  $\text{KOH}_{(\text{aq})}$  ברכזו  $0.1\text{M}$  לסתירה מלאה של חומצות השומן החותפשיות בדגימת השמן.

i מהו מספר המוללים של יוני  $\text{OH}^-$  שהגיעו? פרט את חישוביך.

הנח כי חומצת השומן החותפית העיקרית בשמן הזית היא חומצה أولאית.

המסה המולרית של חומצה أولאית היא  $282 \frac{\text{גרם}}{\text{מול}}$

חשב את המסה של החומצה الأولאית בדגימה. פרט את חישוביך.

iii אחד המדדים לאיכות של שמן זית הוא אחוז החומציות.

מחשבים את אחוז החומציות על פי הנוסחה:

$$\frac{\text{מסת חומצה أولאית בדגימה (גרם)}}{\text{מסת הדגימה (גרם)}} \cdot 100\% = \text{אחוז החומציות}$$

על פי התקן הישראלי, אחוז החומציות המרבי בשמן זית באיכות גבוהה

(כתית מעולה) הוא 0.8%.

קבע אם שמן הזית שבדגימה הוא שמן באיכות גבוהה. פרט את חישוביך ונמק.

## בצלחה!

זכות היוצרים שמורה לממשלת ישראל  
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

## الملحق 1 ورقة إجابات لسؤال 1

### נספח 1

### גיליון תשובות לשאלת 1

<p style="text-align: center;">17. סמל שאלון / رقم התמודג 12 שם המקצוע ויחיותו ללמידה / اسم המوضوع וAPHODIMATIOT</p>	<p style="text-align: center;">22 מס' נבחן / رقم המתבחן 18 31 מס' תיז / رقم ההייוה 23 32 מס' תיז / رقم ההייוה 39 39 מס' תיז / رقم ההייוה 39</p>
--	---

הדקן כאן ↑ מדקנת שאלון  
אחסן هنا ↓ מיליכת נושא בבחן מס' 1 (ללא שם) - צבע ירוק

הדקן כאן ↑ מיליכת נושא בבחן מס' 1 (ללא שם) - צבע ירוק  
אחסן هنا ↓ אונון שם (ללא אונון) - צבע אדום

בכל סעיף הקף במעגל את הספרה המציינת את התשובה הנכונה.  
في كل بند، ضع دائرة حول الرقم الذي يدل على الإجابة الصحيحة.

#### התשובות / الإجابات

#### הסעיף / البند

א.	4      3      2      1
ב.	4      3      2      1
ג.	4      3      2      1
ד.	4      3      2      1
ה.	4      3      2      1
ו.	4      3      2      1
ז.	4      3      2      1
ח.	4      3      2      1