

כימיה

השלמה מ-3 ל-5 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

- א. משך הבחינה: שתיים וחצי.
- ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים.
- | | | | | | |
|-----------|---|--------|---|-----|--------|
| פרק ראשון | — | (25×1) | — | 25 | נקודות |
| פרק שני | — | (25×3) | — | 75 | נקודות |
| סה"כ | — | | | 100 | נקודות |
- ג. חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון (כולל מחשבון גרפי).
- ד. הוראה מיוחדת: **רשום על הצד החיצוני של מחברת הבחינה את הנושאים שענית עליהם בפרק השני.**

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה).
רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/

השאלות


פרק ראשון (25 נקודות)

נושא חובה – אנרגייה ודינמיקה

ענה על אחת מן השאלות 1-2.

שים לב: הקפד על ניסוחים מאוזנים ועל רישום נכון של היחידות.

1. תגובה (1) משמשת בתעשייה הכימית להרחקת פחמן חד-חמצני, $\text{CO}_{(g)}$, מתערובת גזים.





במעבדה ביצעו את תגובה (1) בשני כלים סגורים, A ו-B. נפחו של כל כלי היה 1 ליטר.

לכל אחד מן הכלים הריקים הכניסו 0.45 מול של פחמן חד-חמצני, $\text{CO}_{(g)}$,

ו-1.3 מול של מימן, $\text{H}_{2(g)}$. כל אחד מן הכלים הוחזק בטמפרטורה קבועה.

הטמפרטורה בכלי A הייתה שונה מן הטמפרטורה בכלי B.

הגרפים I ו-II שלפניך מתארים את ההשתנות של ריכוזי המגיבים עם הזמן בכלים A ו-B.



- א. i קבע אם הלחץ בכל אחד מן הכלים עלה, ירד או לא השתנה מתחילת התגובה עד השגת מצב של שיווי-משקל. נמק כל קביעה.
- ii קבע אם במהלך תגובה (1) האנטרופיה של המערכת עלתה או ירדה. הסבר ברמה מיקרוסקופית.
- iii קבע אם במהלך תגובה (1) האנטרופיה של הסביבה עלתה או ירדה. נמק.


ב. עבור המערכת המתוארת בגרף I:

- i חשב את הריכוזים של מתאן, $\text{CH}_4(\text{g})$, ואדי מים, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, במצב שיווי-משקל. פרט את חישוביך.
- ii רשום את הביטוי של קבוע שיווי המשקל עבור תגובה (1), וחשב את ערכו. פרט את חישוביך.

- ג. i קבוע שיווי המשקל של המערכת הנמצאת בכלי A גדול מקבוע שיווי המשקל של המערכת הנמצאת בכלי B.
- קבע איזה גרף, I או II, מתאים למערכת הנמצאת בכלי A. נמק.
- ii קבע באיזה כלי, A או B, הטמפרטורה הייתה גבוהה יותר.

- ד. בדקה ה-12 העלו את הטמפרטורה בכלי B. לאחר זמן מה הגיעה המערכת למצב שיווי-משקל חדש.
- קבע אם במצב שיווי המשקל החדש הריכוז של $\text{CH}_4(\text{g})$ בכלי B היה גבוה מן הריכוז של $\text{CH}_4(\text{g})$ בשיווי המשקל הקודם, נמוך ממנו או שווה לו. נמק.

ה. נתונה תגובה (2):




הסבר מדוע שינוי האנטלפייה בתגובה (2), ΔH_2^0 , גדול משינוי האנטלפייה בתגובה (1), ΔH_1^0 .

2. תאי דלק שבהם מימן, $H_{2(g)}$, מגיב עם חמצן, $O_{2(g)}$, יכולים לשמש מקור אנרגייה חלופי, למשל בהנעת כלי רכב.

בתעשייה משתמשים, בין השאר, במתאנול, $CH_3OH_{(g)}$, כמקור להפקת $H_{2(g)}$.

א. בנוכחות זרז מתאים, מתאנול, $CH_3OH_{(g)}$, מגיב עם $O_{2(g)}$ על פי תגובה (1).




i. בטבלה שלפניך נתונים ערכים של אנתלפיות קשר.

הקשר	C – H	C – O	O – H	O = O	H – H	C = O
אנתלפיית הקשר ($\frac{kJ}{mol}$)	413	358	437	497	436	803

חשב את שינוי האנתלפייה, ΔH_1^0 , בתגובה (1). פרט את חישוביך.

ii. תגובה (1) ספונטנית בתנאי תקן בכל טמפרטורה. הסבר מדוע.


ב. בתנאים מתאימים, $CH_3OH_{(g)}$ מגיב עם קיטור, $H_2O_{(g)}$, על פי תגובה (2).



בטמפרטורה 298 K השינוי באנטרופיה של היקום הוא: $\Delta S_{\text{יקום}}^0 = + 10.4 \frac{J}{K}$.

חשב את שינוי האנטרופיה במערכת, $\Delta S_{\text{מערכת}}^0$, עבור תגובה (2). פרט את חישוביך.

תגובה נוספת המשמשת להפקת $H_{2(g)}$ בתעשייה היא תגובה (3), שבה פחמן חד-חמצני, $CO_{(g)}$, מגיב עם קיטור, $H_2O_{(g)}$.



ג. i לפניך שלושה ערכים של שינוי האנטרופיה במערכת, $\Delta S_{מערכת}^0$:

$$+ 214.8 \frac{J}{K} \quad - 42.4 \frac{J}{K} \quad - 138 \frac{J}{K}$$

קבע איזה מן הערכים הוא הערך המתאים עבור $\Delta S_{מערכת}^0$ של תגובה (3). נמק.

ii בטבלה שלפניך מוצגים ערכים של שינוי האנטרופיה ביקום, $\Delta S_{יקום}^0$,

עבור תגובה (3) בשתי טמפרטורות.

הטמפרטורה (K)	500	1100
$\Delta S_{יקום}^0 \left(\frac{J}{K} \right)$	+ 40	- 4.9

התייחס לשינוי האנטרופיה במערכת, $\Delta S_{מערכת}^0$, ולשינוי האנטרופיה בסביבה, $\Delta S_{סביבה}^0$, והסבר עבור התגובה הישירה מדוע ב- 500 K יש עלייה באנטרופיה של היקום, ואילו ב- 1100 K יש ירידה באנטרופיה של היקום.

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.)

ד. ביצעו את תגובה (3) בשלושה כלים סגורים, I, II, III.

בטבלה שלפניך מוצג מספר המולים של כל אחד מן הגזים שהוכנסו לכל אחד מן הכלים.

מספר המולים של גז שהוכנסו לכלי				נפח הכלי (ליטר)	הכלי
$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{CO}(\text{g})$		
0	0	0.4	0.4	1.0	I
0	0	0.4	0.8	1.0	II
0.2	0.2	0	0	1.0	III

שלושת הכלים הוחזקו באותה טמפרטורה.

לפניך שני ההיגדים i ו-ii הנוגעים למערכת שבכל אחד מן הכלים I, II ו-III.

הסבר מדוע כל אחד מן ההיגדים i ו-ii אינו נכון.

i הערך של K_c , עבור המערכת בכלי II, גדול מהערך של K_c עבור המערכת בכלי I,

כי הריכוז של $\text{H}_2(\text{g})$ במצב שיווי-משקל בכלי II גדול יותר.

ii בכלי III המערכת אינה מגיעה למצב שיווי-משקל, כי לתוך כלי III לא הוכנסו

המגיבים: $\text{CO}(\text{g})$ ו- $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$.

פרק שני (75 נקודות)

בפרק זה שלושה נושאים (שאלות 3-8). עליך לענות על שלוש שאלות (לכל שאלה – 25 נקודות).
רשום על הצד החיצוני של מחברת הבחינה את הנושאים שענית עליהם בפרק זה.

נושא ראשון – פולימרים

3. פוליאטילן, $\text{+CH}_2\text{—CH}_2\text{+}_n$, הוא פולימר נפוץ שמייצרים ממנו, בין השאר, שקיות אריזה, מכלי אחסון, כלי בית, בקבוקים וצינורות השקיה.
 בתנאי פלמור שונים מייצרים סוגים שונים של פוליאטילן, כגון פוליאטילן נמוך-צפיפות (LDPE) ופוליאטילן גבה-צפיפות (HDPE).
 א. לפניך תיאור סכמטי של שתי שרשרות פוליאטילן, I ו-II.



קבע איזו מן השרשרות, I או II, היא שרשרת של פוליאטילן נמוך-צפיפות. נמק.

- ב. בטבלה שלפניך מוצגים ערכי T_g ו- T_m של הפולימרים LDPE ו-HDPE.

טמפרטורת ההיתוך $T_m(^{\circ}\text{C})$	הטמפרטורה הזגוגית $T_g(^{\circ}\text{C})$	הפולימר
110	- 80	LDPE
?	- 50	HDPE

- i ערך ה- T_g של הפולימר HDPE נמוך. הסבר עובדה זו.
 ii הסבר מדוע ערך ה- T_g של הפולימר LDPE נמוך מערך ה- T_g של הפולימר HDPE.
 iii קבע אם ערך ה- T_m של הפולימר HDPE גבוה מ- 110°C או נמוך מ- 110°C .

נמק.

לפניך שתיים מן התכונות הנדרשות מפולימר כדי שיתאים להכנת אריזות למוצרי מזון:

— יכולת טובה לחסום מעבר גזים, בעיקר חמצן, $O_{2(g)}$, ופחמן דו-חמצני, $CO_{2(g)}$.

— יכולת חסימה למעבר לחות, $H_2O_{(g)}$.

ג. חדירת הגזים מתרחשת באזורים האמורפיים של הפולימר ולא באזורים הגבישיים.

הסבר מדוע. בתשובתך התייחס גם לאזורים האמורפיים וגם לאזורים הגבישיים.

ד. פוליוויניל אלכוהול (PVA), $\text{+CH}_2\text{—CH(OH)—}_n$, הוא פולימר שיכולתו לחסום

מעבר של $O_{2(g)}$ ו- $CO_{2(g)}$ היא הטובה ביותר.

ציין חיסרון אחד של שימוש בפולימר PVA להכנת אריזות למוצרי מזון. הסבר.

ה. EVOH הוא קופולימר אקראי המורכב מיחידות פוליאאתילן ומיחידות PVA.

לקופולימר EVOH יש אחוז גבישיות גבוה ויכולת טובה מאוד לחסום מעבר של גזים.

i רשום נוסחת מבנה לקטע של שרשרת הקופולימר EVOH המכיל 12 אטומי פחמן.

ii הסבר מדוע לקופולימר EVOH יש אחוז גבישיות גבוה.

iii ככל שאחוז יחידות ה- PVA בשרשרת הקופולימר EVOH גדול יותר,




ערך ה- T_g של הקופולימר גבוה יותר. הסבר מדוע.

4. השאלה עוסקת בפולימרים אחדים המשמשים לייצור סיבים.

א. מבין המאפיינים (1)-(6) שלפניך, בחר שלושה מאפיינים המתאימים לפולימרים המשמשים לייצור סיבים.

- (1) כוחות בין-מולקולריים חזקים
- (2) קשרי צילוב קוולנטיים
- (3) שרשרות ארוכות ללא קבוצות צדדיות
- (4) טמפרטורה זגוגית, T_g , נמוכה מטמפרטורת החדר
- (5) מבנה אמורפי
- (6) נוכחות קטעים קשיחים בעמוד השדרה בשרשרות

בטבלה שלפניך מוצג מידע על שלושה פולימרים המשמשים לייצור סיבים.

הפולימר	ייצוג מקוצר לנוסחת המבנה של היחידה החוזרת	טמפרטורת ההיתוך, T_m ($^{\circ}\text{C}$)	שימושים אחדים של סיבים שהוכנו מן הפולימר
קוולר		500	כבלי הרמה לרכבל
נומקס		375	ביגוד ממוגן למכבי אש
ניילון 10,6		210	סיבי מברשות



ב. i קבע באיזו שיטה – דחיסה או סיפוח – הוכן כל אחד מן הפולימרים שבטבלה. נמק.

ii רשום ייצוג מקוצר לנוסחאות המבנה של המונומרים עבור כל אחד מן הפולימרים

שבטבלה.

- ג. i הסבר מדוע ערך ה- T_m של קוולר גבוה מערך ה- T_m של ניילון 10,6.
 ii הסבר מדוע ערך ה- T_m של נומקס נמוך מערך ה- T_m של קוולר.
 iii עבור הפולימר קוולר לא נמדד ערך ה- T_g . הסבר מדוע.

ד. נתונות נוסחאות של שני חומרים, I ו- II :



במעבדה ביצעו פלמור בשני כלים A ו- B כדי לקבל ניילון 10,6.

לכל אחד מן הכלים A ו- B הכניסו אותה כמות של מונומרים.

לכלי A הוסיפו חומר נוסף שהגיב בכלי.

- i קבע אם החומר הנוסף הוא חומר I או חומר II. נמק.
 ii קבע אם שרשרות הפולימר שהתקבל בכלי A ארוכות משרשרות הפולימר שהתקבל בכלי B, קצרות מהן או שוות להן באורכן. נמק.
 iii קבע אם היחידה החוזרת של הפולימר שהתקבל בכלי A זהה ליחידה החוזרת של הפולימר שהתקבל בכלי B או שונה ממנה. נמק.

נושא שני


כימיה פיזיקלית — מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה

שים לב: הקפד על ניסוחים מאוזנים ועל רישום נכון של היחידות.

5. השאלה עוסקת בתהליכים המתרחשים בירקות ובפירות.

א. בעת הבשלת מלון נוצר בו הצבען לוטאין, המקנה לפרי את צבעו הצהוב.


לפניך ייצוג מקוצר לנוסחת מבנה של מולקולת לוטאין.



קבע באיזה אורך גל, 450 nm או 580 nm, מולקולות הלוטאין בולעות קרינה. נמק.

ב. הגז אתילן נוצר בצמחים וגורם להבשלה של פירות וירקות רבים.

לפניך נוסחת מבנה של מולקולת אתילן.



i כמה קשרי σ וכמה קשרי π יש במולקולה אחת של אתילן?

ii אתילן בולע קרינה באורך גל של 171 nm.

חשב את הפרש האנרגייה ביחידות J בין אורביטל ה-HOMO לאורביטל ה-LUMO

במולקולה של אתילן. פרט את חישוביך.

iii הסבר מדוע אתילן בולע קרינה באורך גל קצר יותר מאורך הגל שבו הלוטאין בולע.

ג. כדי להאיץ את ההבשלה של מגוון פירות וירקות שנקטפו, מפזרים תערובת גזים במקום האחסון של הפירות והירקות. התערובת מכילה בעיקר גז חנקן, $N_2(g)$, וכ- 5% גז אתילן.

i העתק מדפי הנוסחאות למחברתך את דיאגרמת האורביטלים המולקולריים

המתאימה למולקולת חנקן, $N_2(g)$, והשלם בה את אכלוס האלקטרונים:

— עבור שני אטומי חנקן

— עבור מולקולת חנקן

ii ציין את אורביטלי ה- HOMO וה- LUMO בהערכות האלקטרוניים


במולקולת חנקן במצב אלקטרוני יסודי.

iii חשב את סדר הקשר של מולקולת חנקן. פרט את חישוביך.

ד. כאשר מאחסנים תפוחי אדמה באור, נוצרים כתמים ירוקים על קליפתם וטעמם נעשה מר.

החומר המר הוא סולנין — חומר רעיל האסור לאכילה.

לפניך ייצוג מקוצר לנוסחת מבנה של מולקולת סולנין.



קבע אם הצבע הירוק שנראה על קליפות תפוחי האדמה הוא הצבע של הסולנין. נמק.

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.)

ה.

כדי להאיץ את הבשלתם של תותי שדה שנקטפו, מאירים אותם באמצעות נורת LED (דיודה פולטת אור) כחול.

קבע עבור כל אחד מן ההיגדים a , b , c שלפניך אם הוא נכון או לא נכון.

a ה־ LED הכחול מאיר באורך גל של 470 nm .

b האור שפולט ה־ LED הכחול מתאים להפרש האנרגייה בין פס ההולכה

במל"מ (מוליך למחצה) N לפס הערכיות במל"מ P .


c כאשר ה־ LED הכחול מאיר, מל"מ P מחובר להדק השלילי של הסוללה, ומל"מ N מחובר להדק החיובי.

6. תכשירים המגנים על העור מפני קרינה אולטרה-סגולה (UV) המגיעה מן השמש מכילים חומרים מסנני קרינה.

לפוטונים של קרינת UV אנרגייה גדולה הגורמת נזקים לעור, כגון כוויות. מסנני הקרינה בולעים את הקרינה האולטרה-סגולה בשני תחומים: UVA בתחום אורכי הגל 320 nm - 390 nm, ו־UVB בתחום אורכי הגל 290 nm - 320 nm. בליעת הקרינה מפחיתה את הפגיעה בעור.

א. קבע איזו קרינה, UVA או UVB, גורמת נזק גדול יותר לעור. נמק.

בגרף שלפניך מוצגים ספקטרה בליעה של שני מסנני קרינה מסחריים I ו־II.




- ב. i מסנן הקרינה I מספק הגנה טובה יותר מפני השמש. הסבר עובדה זו.
- ii על פי הנתונים בגרף, אי־אפשר לקבוע מה צבעו של כל אחד ממסנני הקרינה. הסבר מדוע.

- ג. אחת השיטות לשיזוף מלאכותי שלא באמצעות שמש היא בליעת כמוסות של הצבען קנתקסנתין. מולקולות קנתקסנתין מצטברות בשומן שמתחת לעור וצבען נותן לעור מראה שחום. קנתקסנתין בולע קרינה באורך גל 460 nm. מה צבעו של הקנתקסנתין? נמק.
- שיטה אחרת לשיזוף מלאכותי היא שיזוף באמצעות נורות המאירות בתחום קרינת UV.
- ד. בעבר השתמשו, בין השאר, בנורות כספית לשיזוף.
- לפניך ערכים של אורכי הגל שבהם נפלטת קרינה אולטרה-סגולה ממנורת כספית ששימשה לשיזוף: 302 nm, 312 nm, 313 nm, 334 nm, 365 nm.
- i חשב את תדירות הקרינה הנפלטת באורך גל 312 nm. פרט את חישוביך.
- ii הסבר מדוע ספקטרום הפליטה של נורת כספית הוא קווי ולא רציף.
- ה. כיום מעדיפים להשתמש לשיזוף במגוון של נורות LED (דיודות פולטות אור). נורות אלה פולטות קרינה, בין השאר, באורכי הגל: 365 nm, 385 nm, 395 nm, 405 nm.
- i ציין יתרון אחד של שיזוף באמצעות נורות LED על פני שיזוף באמצעות נורות כספית.
- ii קבע אם הפרש האנרגייה בין פס ההולכה לפס הערכיות בנורות LED הפולטות קרינה בתחום האולטרה-סגול, גדול מהפרש האנרגייה בנורות LED הפולטות קרינה בתחום הנראה. נמק.

נושא שלישי — כימיה של חלבונים ושל חומצות גרעין

7. המוגלובין הוא חלבון המצוי בתאי דם אדומים. תפקידו העיקרי הוא נשיאת חמצן מן הריאות אל כל תאי הגוף. ההמוגלובין הוא חלבון כדורי (גלובולרי). מולקולה של המוגלובין בנויה מארבע שרשרות פוליפפטידיות.
- באיור I מוצג מודל המבנה המרחבי של אחת מן השרשרות הפוליפפטידיות במולקולה של המוגלובין.
- שרשרת זו בנויה מ-146 שיירים של חומצות אמיניות והיא מקופלת למבנה כדורי. המבנה מכיל שמונה סלילי α המופרדים על ידי קטעים ללא מבנה מוגדר.



איור I

- א. בטבלה שלפניך מוצג מידע חלקי על סוגי המבנים בשרשרת הפוליפפטידית שבאיור I.
- i העתק את הטבלה למחברתך והשלם בה את המידע החסר, בתוך התייחסות לשרשרת הפוליפפטידית שבאיור I.

סוג המבנה	תיאור המבנה	הכוחות / הקשרים המייצבים את המבנה	הקבוצות שביניהן נוצרים הכוחות / הקשרים
ראשוני		קשרים פפטידיים	
שניוני	שמונה סלילי α המופרדים על ידי קטעים ללא מבנה מוגדר		
שלישוני			קבוצות צד של חומצות אמיניות רחוקות זו מזו בִּרְצֵף

- ii בקצה של חלק מסלילי α הבונים את השרשרת הפוליפפטידית שבאיור I, מצוי השייר של החומצה האמינית פרולין, Pro. שייר זה גורם להפסקת קיפול השרשרת לסליל α . הסבר מדוע.

אנמיה חרמשית היא מחלה תורשתית הנובעת מיצירה של מולקולות המוגלובין פגומות בגוף. המחלה נגרמת ממוטציה גנטית – שינוי בנוקלאוטיד אחד ב־ DNA, בגן שתפקידו לקודד ליצירת החלבון.

- ב. i ציין את המרכיבים של נוקלאוטיד אחד ב־ DNA.
- ii בין המרכיבים של נוקלאוטיד אחד יש שני סוגים של קשרים קוולנטיים.
- ציין את השמות של שני סוגי קשרים אלה.
- ציין בין אילו מרכיבים נוצרים הקשרים האלה.

(שים לב: המשך סעיפי השאלה בעמוד הבא.)

ג. לפניך שני קטעים, (1) ו- (2), של DNA : האחד מקודד לקטע תקין בהמוגלובין, והאחר מקודד לקטע פגום בהמוגלובין, הגורם לאנמיה חרמשית.

(1) 3' GGACTTCTT 5'

(2) 3' GGACATCTT 5'

i רשום לכל אחד משני קטעי ה-DNA את רצף הנוקלאוטידים בקטע של mRNA המתועתק ממנו. ציין את קצה 3' ואת קצה 5'.

ii רשום את רצף החומצות האמיניות שנוצר בתרגום של כל אחד משני קטעי ה-mRNA שרשמת בתת-סעיף ג i.

ד. ב- $\text{pH} = 7$ המטען הכולל של מולקולות המוגלובין, תקין ופגום, הוא שלילי.

אולם המטען הכולל של מולקולות ההמוגלובין התקין הוא שלילי יותר.

i קבע איזה מן הרצפים של חומצות אמיניות שרשמת בתת-סעיף ג ii, הוא חלק ממולקולת ההמוגלובין התקין. נמק.


ii רשום ייצוג מלא של נוסחת המבנה לרצף של שלוש החומצות האמיניות, שהוא חלק ממולקולה של ההמוגלובין הפגום, ב- $\text{pH} = 7$.

8. גלופטיון הוא נוגד חמצון חשוב הפועל בעיקר בכבד.

מולקולת גלופטיון מורכבת משלושה שיירים של חומצות אמיניות: חומצה גלואטמית, Glu,

ציסטאין, Cys, וגליצין, Gly.

לפניך ייצוג מקוצר לנוסחת המבנה של גלופטיון ב- $\text{pH} = 7$.



א. i רשום ייצוג מלא לנוסחת המבנה של גלופטיון ב- $\text{pH} = 7$.

ii קבע בין אילו קבוצות פונקציונליות נוצר בגלופטיון הקשר בין חומצה גלואטמית, Glu,

לציסטאין, Cys.

ב. גלופטיון עבר הידרוליזה מלאה בתמיסה חומצית ב- $\text{pH} = 1$.

בטבלה שלפניך מוצגים ערכים של pKa .

החומצה האמינית	הסימון	pKa_1 קבוצה קרבווקסילית	pKa_2 קבוצה אמינית	pK_R קבוצה צדדית
גליצין	Gly	2.34	9.60	—
ציסטאין	Cys	1.96	10.28	8.18
חומצה גלואטמית	Glu	2.19	9.67	4.25

i רשום ייצוג מלא לנוסחאות המבנה של תוצרי ההידרוליזה של גלופטיון ב- $\text{pH} = 1$.

ii חשב את הנקודה האיזואלקטרית, pI , של שתי החומצות האמיניות:

גליצין וחומצה גלואטמית. פרט את חישוביך.

iii קבע עבור כל אחת משתי החומצות האמיניות: גליצין וחומצה גלואטמית,

את המטען הכולל שעל החומצה האמינית בנקודה האיזואלקטרית, pI .

ג. לכל אחת משלוש החומצות האמיניות המרכיבות את מולקולת הגלוטתיון מתאימה לפחות מולקולת tRNA אחת.

i רשום אנטיקודון מתאים לכל אחת משלוש החומצות האמיניות במולקולת tRNA.

לכל אנטיקודון ציין את קצה 3' ואת קצה 5'.

ii ציין את סוג הקשרים הנוצרים בין האנטיקודון במולקולת tRNA לבין מולקולות mRNA.

iii קבע איזה מבין שלושת סוגי הקשרים: פפטידי, אסטרי או קשרי מימן, נוצר בין מולקולת tRNA לבין חומצה אמינית.

ד. לפניך שני קטעי mRNA, (1) ו-(2).

(1) 5' GAA UGU GGU 3'

(2) 5' GAG UGC GGG 3'

קבע עבור כל אחד מן הקטעים (1) ו-(2) אם הוא מתורגם בתא לגלוטתיון. נמק.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך