

סוג הבחינה: בגרות  
מועד הבחינה: קיץ תשפ"ב, 2022  
מספר השאלה: 035581  
דף נוסחאות ל-5 ייחדות לימוד  
נספח:

שימו לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות.  
יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה.

## מתמטיקה 5 ייחדות לימוד — שאלון ראשון

### הוראות

א. משך הבחינה: שלוש שעות וחצי.

ב. מבנה השאלה ופתחה הערכתי: שאלון זה שלושה פרקים, וביהם שמונה שאלות.

- פרק ראשון — אלגברה והסתברות  
פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור  
פרק שלישי — חישובן דיפרנציאלי ואיינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציניות ושל פונקציות טריגונומטריות  
יש לענות על חמש שאלות לבחירתכם —  $5 \times 20 = 100$  נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

- (1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון שיש בו אפשרות תכנוט.  
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.  
(2) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- (1) אין להעתיק את השאלה; יש לסמן את מספורה בלבד.  
(2) יש להתחיל כל שאלה בעמוד חדש. יש לרשום במחברת את שלבי הפתרון, גב' כאשר החישובים מתבצעים בעוררת מחשבון.  
יש להסביר את כל הפעולות, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.  
חסור פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה,  
כתיבת טיוטה בדף שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהם באופן אישי.

### בהתכלחה

## השאלות

שימו לב: יש להסביר את כל הפעולות, כולל חישובים, בפירות ובצורה ברורה.

חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בזכין או לפסילת הבחינה.

ענו על תmesh מן השאלות 1-8 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שימו לב: אם תענו על יותר מבחן שאלות, ייבדק רק חמש התשובות הראשונות שבמחברת.

### פרק ראשון – אלגברה והסתברות

1. מכוניות יצאה מבאר שבע לחיפה במהירות קבועה  $v_1$ . באותו הזמן בדיקן יצא מהאייה לבאר שבע ב מהירות קבועה  $v_2$ .

המרחק בין חיפה לבאר שבע הוא 210 ק"מ. המשאית נעצרה בצד הדרכּ עקב תקללה, לפני שחלפה המכונית על פניה. באותו הזמן המרוחק בין המשאית לבין המכונית היה 98 ק"מ.

א. תקבעו באמצעות  $v_1$  ו-  $v_2$  את הזמן שהלך מרגע תחילת הנסעה ועד שנעצרה המשאית בצד הדרכּ. זמן שהיית המשאית בצד הדרכּ היה גדול פי 1.5 מן הזמן שהלך מרגע יציאתה מהאייה עד לרגע עצירתה.

ב. מצאו את היחס בין מהירות המכונית לבין מהירות המשאית.

140 דקוטות לאחר שיצאה המשאית שוב לדרכּ, היא הגיעה לבאר שבע.

ג. מצאו את מהירות המכונית ואת מהירות המשאית.

2. סדרה I היא סדרה הנדסית אינטסופית שאיבריה הם  $\dots, a_3, a_2, a_1$  ומנתה היא  $r^2 \cdot 9$ .

$$\text{נתון: } r < \frac{1}{3}.$$

בין כל שני איברים בסדרה I הכנסו איבר נוסף, ונוצרה סדרה הנדסית חדשה יורדת, סדרה II, שאיבריה הם  $\dots, b_3, b_2, b_1$  ומנתה היא  $q$ .

א. (1) הביעו את  $q$  באמצעות  $r$ .

(2) הסבירו מדוע שתי הסדרות I ו-II מתכננות.

$$\text{נתון כי סכום סדרה II גדול פי } \frac{4}{3} \text{ מסכום סדרה I.}$$

ב. חשבו את  $q$ .

נתון כי סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה II הוא 15.

ג. מצאו את סכום כל האיברים של סדרה II במקומות שמתחלקים ב-5 ( $\dots, b_5, b_{10}, b_{15}, \dots$ ).

ד. מצאו בסדרה II את היחס בין האיבר החמישי לבין סכום כל האיברים שאחריו איבר זה.

ה. הוכיחו כי בכל סדרה הנדסית מתכננת היחס בין איבר כלשהו לבין סכום כל האיברים שאחריו אינו תלוי במיקום של האיבר בסדרה.

3. נטו משחкат במשחק מסויים. במשחק זה יש לבדוק שלוש תוצאות אפשריות: ניצחון, תיקו והפסד.

הסתברות שנטו ניצח במשחק גדולה פי 3 מן ההסתברות שהיא תפסיד במשחק.

נסמן ב- $k$  את ההסתברות שנטו תפסיד במשחק ( $0 < k < 1$ ).

בשאלה יכולה תוצאות המשחקים אין תלויות זו בזו.

נתון שגם נטו משחקת 2 משחקים בזאה אחר זה, ההסתברות שהיא ניצח במשחק אחד לפחות היא 4.5%.

א. מצאו את הערך של  $k$ .

נטו שיחקה 5 משחקים בזאה אחר זה.


ב. מצאו את ההסתברות שנטו ניצח ב-3 משחקים לפחות.

ג. מצאו את ההסתברות שנטו ניצח בשלושת המשחקים הראשונים לפחות.

ד. (1) מצאו את ההסתברות שנטו לא תפסיד בשום משחק.

(2) ידוע כי נטו הפסידה במשחק אחד לפחות. מהי ההסתברות שהיא ניצחה בשלושת המשחקים הראשונים וקיבלה תוצאות תיקו במשחק האחרון?

## פרק שני — גאומטריה וטיריגונומטריה במישור



4. נתון מעגל שרדיוסו  $R$  ומרכזו  $O$ .

מנקודה  $A$  שמחוץ למעגל יוצאים שלושה ישרים:

הישר  $AB$  משיק למעגל בנקודה  $B$ ,

הישר  $AD$  עובר דרך מרכזו  $O$  וחותך את המעגל בנקודות  $C$  ו $D$ ,

והישר  $AG$  מאונך לישר  $AD$  (ראו סריטוט).

הנקודות  $D$ ,  $B$ ,  $D$  ו $G$  נמצאות על ישר אחד, כמפורט בסריטוט.

נסמן:  $\angle ADB = \alpha$ .

א. הביעו את כל זוויות המשולש  $ABG$  באמצעות  $\alpha$ .

ב. הוכחו:  $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{BC}$


נתון:  $AG = 7$ ,  $AC = \frac{1}{2}DC$

ג. חשבו את  $R$ .

נסמן ב- $S$  את שטח המשולש  $BDC$ .

ד. (1) הוכחו:  $\triangle ADG \sim \triangle BDC$ .

(2) הביעו את שטח המשולש  $ADG$  באמצעות  $S$ .



5. מרובע  $ABCD$  חסום במעגל שרדיוסו  $R$  ומרכזו  $O$  (ראו סריטוט).

נסמן:  $\angle DAB = \alpha$ ,  $\alpha$  היא זוית חדה.

א. הביעו את אורך האלכסון  $BD$  באמצעות  $\alpha$  ו- $R$ .

נתון:  $CD = R\sqrt{2}$ ,  $BC = R$

ב. חשבו את  $\alpha$ .

נתון:  $BD$  הוא חוצה זוית  $ABC$ .

ג. חשבו את גודל הזווית  $ABD$ .

נסמן ב- $h_1$  את הגובה שיורט מקודקוד  $A$  במשולש  $ABD$ ,

וב- $h_2$  את הגובה שיורט מקודקוד  $O$  במשולש  $BOD$ .

ה. חשבו את  $\frac{h_1}{h_2}$

**פרק שלישי — חישוב דיפרנציאלי ואנטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רצינניות ושל פונקציות טרייגונומטריות**

6. נתונה הפונקציה  $f(x) = 3x + \frac{3}{x}$ .

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה  $f(x)$ .

(2) האם הפונקציה  $f(x)$  היא זוגית, אי-זוגית או לא-זוגית? הוכיחו את התשובה.

(3) מצאו את תחומי העליה ואת תחומי הירידה של הפונקציה  $f(x)$ .


נתונות שתי פונקציות:  $f'(x)$  ו-  $g(x)$ .

$f'(x) = f(x) \cdot g(x)$ ,  $f'(x) \neq 0$  מקיים  $f'(x) > 0$ .

הפונקציות  $f'(x)$  ו-  $g(x)$  מוגדרות באותו תחום כמו הפונקציה  $f(x)$ .

ב. כל אחד מן הגрафים I–III שלפניכם מותאם אחת הפונקציות  $f(x)$ ,  $f'(x)$  ו-  $g(x)$ .

לבלאתם מן הפונקציות כתבו איזה גרפף מותאם אותה. נמקו את התשובה.



ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה  $g(x)$  עם ציר  $x$ .

ד. חשבו את השטח המוגבל על ידי הפונקציה  $g(x)$ , על ידי ציר  $x$  ועל ידי הישרים  $x = \frac{1}{2}$  ו-  $x = 2$ .

ה. נתון:  $a < 1$  הוא פרמטר. חשבו את  $\int_{\frac{1}{a}}^a g(x) dx$ .

נתונה הפונקציה  $h(t) = \int_1^x f'(t) dt$ . נתנו כי הפונקציה  $h(x)$  מוגדרת בתחום  $x \leq 1$ .

ג. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  $h(x)$ , וקבעו את סוגה.

7. נתונה הפונקציה  $f(x) = \frac{2(\cos x)^2 + \sin 2x}{2 \cos x}$  בתחום  $0 \leq x \leq 2\pi$ .
- מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה  $f(x)$ .
  - הסבירו מדוע לפונקציה  $f(x)$  אין אסימפטוטות המאונכות לציר  $x$ .
  - מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  $f(x)$  עם הצירים.
- ב. (1) פראו כי לכל  $x$  בתחום ההגדרה של הפונקציה  $f(x)$  מתקיים:  $f'(x) = \cos x - \sin x$
- מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  $f(x)$ , וקבעו את סוגן.
- ג. (1) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .
- (2)  $t$  הוא מספר. מצאו את כל ערכי  $t$  שבעבורם יש למשווה  $t = f(x)$  פתרון יחיד בתחום  $0 \leq x \leq 2\pi$ .
- ד. חשבו את השטח המוגבל על ידי פונקציית הנגזרת  $f'(x)$ , על ידי ציר  $x$  ועל ידי שני הישרים  $x = \frac{3}{4}\pi$  ו-  $x = \frac{5}{4}\pi$ .

8. נתונות שתי פונקציות:  $g(x) = \sqrt{f(x)}$ ,  $f(x) = x^3$ .
- א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה  $g(x)$  ואת תחום ההגדרה של הפונקציה  $f(x)$ .
- (2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  $g(x)$  עם גרף הפונקציה  $f(x)$ .
- הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה  $f(x)$ , והנקודה B נמצאת על גרף הפונקציה  $g(x)$  כך שהקטע AB מקביל לשורש  $x$  של הנקודה A, והנקודה B נמצאת בין שורשי הנקודות A ו-B.
- נתון כי שורש ה- $x$  של הנקודה A נמצא בין שורשי ה- $x$  של הנקודות A ו-B. נסמן ב- $k$  את שורש ה- $x$  של הנקודה A. k הוא פרמטר.
- ב. חbijו באמצעות k את אורך הקטע AB.
- ג. הנקודה O היא ראשית הצירים. מצאו את השטח המקסימלי של המשולש OAB.
- ד. האם השטח המקסימלי של המשולש OAB מתקבל כאשר אורך הקטע AB הוא מקסימלי? נמקו את התשובה.

### בצלחת!

זכות היוצרים שמורה למדייניות ישראל  
אין להעתיק או לפרסם ללא אישור משרד החינוך